

NO ESTÁS SOLA EN ESTO.

Alguien te entregó este folleto porque quería que supieras que hay apoyo para ti en esta comunidad.

Podemos ayudar a las personas embarazadas y a los nuevos padres con:

- Vivienda
- Cuidado de la salud
- Transporte
- Compras de comida
- Ropa de maternidad
- Artículos para bebés
- Cuidado de niños
- y más

Por favor, déjanos saber como podemos ayudarte.

Hemos incluido números de teléfono y enlaces a algunos de estos recursos en el área e información sobre el embarazo, el aborto y sus derechos legales para asegurarnos de que tiene todos los datos que necesita.

Si desea discutir sus opciones con un oído empático:

OPTIONLINE.ORG

Línea directa de ayuda nacional para el embarazo las 24 horas

1-800-712-HELP (4357)

o texto "HELPLINE" al 313131

LÍNEA DIRECTA DE AYUDA PARA EL EMBARAZO
1-800-712-HELP (4357) • optionline.org

LÍNEA NACIONAL DE ASALTO SEXUAL
1-800-656-4673 • rainn.org
chat en vivo disponible en línea

LÍNEA NACIONAL DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
1-888-799-7233 • thehotline.org
chat en vivo disponible en línea

LÍNEA DE TRÁFICO HUMANO NACIONAL
1-888-373-7888 o texto HELP al 233733
traffickingresourcecenter.org

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA WIC
<http://www.fns.usda.gov/wic>

RECURSOS LOCALES:

Este folleto fue creado por Rehumanize International
744 E WARRINGTON AVE., PITTSBURGH, PA, 15210
REHUMANIZEINTL.ORG



SI ESTÁ EMBARAZADA
O CREE QUE PODRÍA ESTARLO,
SE MERECE
TODA LA
INFORMACIÓN.



Hay recursos que pueden ayudarla a tomar la mejor decisión para usted y su hijo.

VIDA ANTES DEL NACIMIENTO

medida por fertilización o FUM



9 SEMANAS*


PRIMER TRIMESTRE

Fertilización: ha comenzado una nueva vida humana; son únicos e irrepetibles

3 semanas: el corazón comienza a latir

6 semanas: ondas cerebrales detectadas

8 semanas: todos los órganos internos están presentes y funcionando




13 SEMANAS*

SEGUNDO TRIMESTRE

(13–24 semanas)

16 semanas: el bebé ocupa todo el espacio del útero

18 semanas: el bebé puede responder a los estímulos



23 SEMANAS**

20 semanas: el sexo del bebé es aparente

22 semanas: si nace en esta etapa, el bebé podría sobrevivir por su cuenta

TERCER TRIMESTRE

(24+ semanas)

El bebé continúa aumentando de peso y alcanza el “término completo” entre las 38 y 40 semanas

*Foto de lunar caustic en Flickr

**Foto de woodleywonderworks en Flickr

ENCUENTRE MÁS INFORMACIÓN, FOTOS Y VIDEOS DEL DESARROLLO PRENATAL EN EHD.ORG

Sepa que tiene derechos: nadie, ni sus padres, su pareja o su jefe, puede obligarla a abortar. Si está siendo amenazada o coaccionada, alerta a las autoridades.

EL PROCEDIMIENTO DE ABORTO

PRIMER TRIMESTRE

Aspiración al vacío (se usa hasta las 12 semanas)

› Implica el uso de un tubo hueco llamado cánula que se conecta a una botella y una aspiradora, que es aproximadamente 27 veces más potente que una aspiradora doméstica. La cánula se inserta en el útero, se enciende la bomba y se extrae el contenido del útero.

Dilatación y curetaje (D&C) (hasta las 16 semanas)

› Implica estirar el cuello uterino para insertar una cureta redonda y afilada, que se usa para alcanzar y desgarrar al feto.

RU-486 (se puede tomar hasta las 9 semanas)

› Implica tomar dos píldoras. El primero, Mifeprex, bloquea la progesterona (la hormona del embarazo) y generalmente se toma en el centro de abortos. La segunda píldora, Misoprostol o Cytotec, expulsa al bebé del útero; generalmente se toma en casa.

SEGUNDO TRIMESTRE

Dilatación y evacuación (D&E) (más de 16 sem.)

› Por lo general, un procedimiento de dos días; implica la inserción de laminaria para dilatar el cuello uterino. Se puede administrar un medicamento como la digoxina para detener el corazón del bebé. › El segundo día, el abortista usa fórceps para agarrar y sacar al bebé en pedazos. Alternativamente, pueden inducir el parto.

TERCER TRIMESTRE

Aborto con digoxina

› Por lo general, un procedimiento de tres días; implica administrar digoxina (que detiene el corazón del bebé) e inducir el parto para dar a luz al niño fallecido.

RIESGOS EMOCIONALES Y FÍSICOS DEL ABORTO

Físico: infección, sangrado, calambres, fiebre, cicatrices, hemorragia

Emocional: depresión, culpa, alteraciones del sueño, ira, aumento del uso de drogas, disfunción sexual, aumento del riesgo de suicidio, trastorno de estrés postraumático



PIDA VER SU ULTRASONIDO.

Incluso si está en el centro de abortos y ya pagó por su aborto (pero no ha realizado el procedimiento), aún puede cambiar de opinión y recuperar su dinero.

REVERSIÓN DE LA PÍLDORA ABORTIVA

Si ha tomado RU-486 (la píldora abortiva) o ha iniciado un aborto de varios días, *es posible que aún haya tiempo para salvar a su bebé.*

1-877-558-0333 · ABORTIONPILLREVERSAL.COM

Si desea obtener más información sobre los procedimientos de aborto de un profesional médico, visite:

ABORTIONPROCEDURES.COM

¿YA TUVO UN ABORTO?

Si está luchando con su aborto anterior, puede comenzar su curación y tomar una decisión que salve vidas hoy para usted y su hijo. Comuníquese con:

HOPEAFTERABORTION.COM